
Cne. PELLETIER

SOUVENIRS BOTANIQUES

1re PARTIE


R M



Avena elatior — Avoine élevée



Flouve odorante — Anthoxanthum odoratum.

Dactyle pelotonné — Dactylis glomerata.



Paturin annuel

Poa Annua (Linnée) très commun le long des chemins, dans les rues de Fontainebleau. &c. mai 1829



Panic âpre.

Setaria verticillata (Palisot de Beauvois) *Panicum verticillatum* (Linnée) 7bre

Les oiseaux aiment beaucoup les graines de cette plante. Panic verticillé

Chiendent pied de poule



Paspalum dactylon

Paspale pied de poule

Cinodon dactylon, (Richard.) Panicum dactylon (Linnée.) aout 1829.

Chiendent-pied-de-poule. De même que la racine du Triticum Repens, celle de cette plante est employée en médecine. On fait avec sa décoction, des boissons délayantes, légèrement diurétiques. on en retire du sucre.



Blé barbu

blé ordinaire

Froment barbu Triticum hybernum.
Froment d'hiver



Seigle cultivé
Secale sativum

orge quadrangulaire.
hordeum quadrangulare



Avoine cultivée Avena Sativa.



Bromus Sterilis

Brome stérile



Froment glauque

Chiendent   Triticum ~~repens~~ glaucum.   Ivraie vivace.

Les racines de cette plante sont moins employées en médecine que celles du Triticum Repens.

Lolium perenne (Lin) Raigrass.



hordeum murinum

Orge des murs

Brome mou. Bromus mollis



Arum maculatum. Pied de Veau. Gouet. Gouet commun

des lieux humides du parc de fontainebleau 1829.

Dessiné dans une proportion moitié moins grande que nature.

La racine d'Arum est acre et corrosive étant fraiche; on la conseille dans les engorgemens froids des viscères; elle est très purgative; on s'en sert dans quelques cantons de la france pour le blanchiment du linge on peut en retirer une fécule amilacée très nutritive.



Abama Ossifraga. trouvé par M.Ls. de Guernisac dans les marais des environs de Morlaix. 1841.

Abama des marais



Sceau de Salomon

Muguet anguleux

Convallaria polygonatum

Polygonatum uniflorum Desf. Convallaria polygonatum (Linaus)

Sceau de Salomon de la forêt de fontainebleau. mai 1829.

Cette plante est reputée astringente. On dit sa racine vomitive.

Sceau de Salomon



[illegible] 1828



Muguet majalis

Convallaria Majalis. Lin. Du parc de Coat-serho. Mai 44.

Petit houx!



Ruscus Aculéatus (Linn) de la foret de Compiegne. decembre 1830. Fragon piquant

La racine du petit Houx est diurétique, la plante, quoi que très épineuse ~~étant~~ vieille, a ses pousses bonnes à manger lorsqu'elles sortent de terre. La graine torréfiée a le gout du Café.



Fluteau renoncule

Alisma Ranunculoïdes Lin.

Recueilli dans les environs de Morlaix en aout 1839 par M. Roulloin, chirurgien major en permanence de la garnison de cette ville.

sagittaire
Flèche d'eau.



Sagittaria sagittifolia (Lin.)

recueilli au bord du Cher près de Tours en 7.bre 1831.

Jonc fleuri



Butome en ombelle

Butomus umbellatus (Lin) des lieux humides des environs de Tours, juin 1831.

Colchique. Veillote.



Colchique d'Automne

Colchicum autumnale (Linnée) d'une prairie dans la plaine de Choisi pres compiègne. Septemb. 1830 et

L'ognon du colchique passe pour très énergique étant récent; cependant des expériences directes prouve qu'on a exagéré sa violence, du moins dans nos climats froids. On l'estime incisif et diurétique. A. Pierrefond près compiègne, des vaches furent empoisonnées par cette plante.



fritillaire méléagre
damier.

Fritillaire pentade

fritillaria Meleagris. Lin. des environs de Libourne mars 1833.





Asphodèle rameux

Asphodelus Ramosus. Lin.

cette plante fut recueillie par Madame de Guernisac dans les environs de sa terre du Mur près Morlaix juin 1819.



tubirosités
formant la racine de l'Asphodèle.



Muscari ambrosiacum L.

Muscari odorant

du jardin de Pors-an-trez. 13 avril 1845

Ail des chiens.



Muscari à grappe

Muscari Racemosum.

hyacinthus Racemosus (Lin.) des environs de Tours. Avril 1831.



Phalangère bicolore
Phalangium bicolor
Anthericum Bicolor.

Recueilli par le Capitaine Aubert du 57e. dans un petit bois près de Mauléon, basses Pyrenées
Mai 1834.



Scilla Nutans smith. de la forêt de fontainebleau mai 1829.
Scille penchée



Scille à feuilles étalées

Scilla Patula. Dec. Hyacinthus patulus. Desf.

Découverte par Mad. Pelletier le 2 mai 1819 sur un rocher humide à Morlaix, et recueillie par Mr. Louis de Guernisac au risque de se rompre le cou.



Scilla autumnalis Lin. Envoyé à Morlaix, à M. L. de Guernisac le 1er mai 1846. le bulbe a été planté par ce dernier en souvenir de M. Crouan naturaliste à Brest, qui lui a envoyé cette plante recoltée aux environs de cette ville.

Scille d'automne.



1846 de M Crouan naturaliste à Brest reçu à Morlaix le 1 mai le bulbe est planté aux serres

E. *Scilla umbellata* Envoyé par Mr. Crouan, naturaliste à Brest le 1er. Mai 1846. Le bulbe de cette jolie plante a été plantée à la terre du Mur.

Scille en ombelle.

Ornithogalle des pyrénées.



Ornithogalum Pyrenaïcum. Variété, stachyoïdes de fontainebleau

ornithogale épi de lait. mai 1829.



Dame d'onze heures.

Ornithogale en ombelle

Ornithogalum umbellatum (Linn.) des environs de Libourne, avril 1833. trouvé par Mad. Pelletier.



Ail des Ours

Allium Ursinum L. Recueilli à la terre de Lanidy près Morlaix 18 mai 1844. 32

97



Allium Paniculatum Linn. 24 avril 1848.

Ail en panicule.



Allium flavum delaforet defontainebleau. juill. 1829	Allium compactum sur un vieux mur dans levillage d'Avon Juillet 1829.	Scilla autumnalis. des lieux secs delaforet defontaineb. septembre 1829.



Aillot.
Porillon.
Narcisse des bois.
jonquille

Narcisse
faux-narcisse

Narcissus pseudo-narcissus. des environs de Libourne. 3 mars 1833.
Narcissus-Junquilla. vrai nom. L.



Narcisse à 2 fleurs

Narcissus biflorus. Recueilli par M. L. de Guernisac dans une prairie près du Dreff. en Plougastel - Daoulas. le 12 Mai 1850.



Narcissus calathinus
Narcisse calathin.

Recueillies aux iles de Glenan, et envoyés par Mr. Crouan de Brest, 16 avril 1849.



Iris d'Allemagne.

Iris d'Allemagne Germanique

Iris Germanica (Lin.) recueillie au hameau de Conda près Libourne, avril 1833.

Iris, ou Glayeul des marais



Iris faux-acore

Iris Pseudo-Acorus Lin. des prairies de Provins; mai 1836.

on a essayé de remplacer le café par sa graine grillée.



Iris fœtidissima, Lin. dans les haies non loin de la mer. Grève de S.t Michel. Recueilli par M.me Pelletier en Juillet 1847 et transplantée dans les jardins du Mur. Peint le 10 juillet 1848

Iris gigot



Iris fétide
Iris fœtidissima

Graines de l'Iris fétide L. Morlaix 25 mars 1845.



Ixia bulbocode

Ixia Bulbocodium. Lin.

Trouvée par Mr Eugène de Treachquerault dans les environs de Morlaix en mars 1839.



Safran découpé

Crocus Multifidus. (Safran.) Recueilli par Madame Pelletier dans un petit bois au pied des Pyrénées en Novembre 1834.

les feuilles ne se recueillent qu'en mars.



Orchis à deux feuilles

Orchis bifolia Linnée. Platanthera bifolia, Richard. des lieux humides de la forêt de Fontainebleau, mai 1829.



Orchis pyramidal.

Orchis pyramidalis des prés et lieux secs de la forêt de fontainebleau 1829. Trouvé par M. Renier.



Orchis morio. L. Variété robuste, plus développée dans toutes ses parties que celui décrit par les auteurs. Celui ci a été recueilli dans le parc de Keranrou par Mlle Guillemot le 5 Mai 1848. Orchis laxiflora

Orchis bouffon.



Orchis morio. (Linnée.) Bouffon (Thuill.) des gazons de fontainebleau mai 1829.

C'est avec les bulbes des Orchis et surtout avec ceux de l'orchis morio, qu'on prépare le Salep, substance amilacée, nutritive, estimée aphrodisiaque. on préfère celui qui vient de Perse.



feuilles tachées ou non tachées
fleurs variant de la couleur pourpre à la blanche

Orchis mâle

Orchis Mascula. Lin. Recueilli par Mr L. de Guernisac aux environs de Morlaix le 16 avril 1844.

Orchis à fleurs laches



Orchis laxiflora (Lamar) des prés humides des environs de libourne mai 1833.



Orchis brulé.

Orchis ustulata du parc de Fontainebleau, mai 1829.

Orchis casque-Militaire



Orchis Militaris des taillis de la foret de Fontainebleau



Orchis singe

Orchis simia

Orchis tephrosanthos. zoophora (Thuillier) singe pendu.

Des coteaux boisés de la forêt de Fontainebleau, mai 1829.

Satyre puant.



Orchis à odeur de bouc

Orchis hircina

Satyrium hircinum (Lin.) sur la colline qui domine Cours. juin 1831

Orchis à larges feuilles.



Orchis Latifolia des Prés humides des environs de Provins mai 1830.



Orchis maculé.

Orchis taché

Orchis Maculata de la foret de fontainebleau, pres le village de Bouron, trouvé par Mad. Renier

44



Orchis à long-éperon.

Orchis Conopsea, Lin. des prairies humides des environs de Morlaix. L. de G. juin 1844. 25

46



Ophrys pantin.

Ophrys antropophora. ophrys pendu. mai 1829. fontainebleau.
Ophrys homme pendu

Ophrys mouche.



Ophrys myodès. ophrys mouche. parc de fontainebleau mai 1819.



Oprys araignée.

Ophrys abeille

Ophrys apifera (Levaillant) un des 4 insectifères de Linée. trouvé par Jules à Tours. Juin 1831.

Ophrys arachnites. Ophris araignée, de la foret de fontainebleau, mai 1829.



Serapias lingua. *Serapias* à languette. Mauléon avril 1834.



Sérapias en cœur

Serapias Cordi-gera. Helleborine porte-cœur.

des environs de Mauléon en mai 1834. Cette Orchidée me fut indiquée par mon collègue Dupeuty.



Néottie spirale

Ophrys spiralis, Lin. Neottia spiralis, Swartz.

Recueilli par Mr. Louis de Guernisac, aux environs de Morlaix en 8.bre 1837.



Néottie d'été
Neottia aestivalis

18 Juillet

Neottia aestivalis Dec. Recueilli par Mr Eugene de Crechquerault dans les prairies de Lan-nevez le 18 Juillet 1846.

Néottie d'été.



Serapias Palustris. Lin. Recueilli par M. L. de Guernisac
dans un marais en Ploujgrean. 21 juillet 1844. —



hellebórine à feuilles large.

Epipactis latifolia

Epipactis à larges feuilles

Serapias Latifolia (Linné) lé long des petites rivières de provins sous les arbre



helléborine à fleurs grandes

Epipactis ensifolia
Epipactis en glaive

Serapias grandiflora Longifolia (Linnée) Epipactis ensifolia (Decand.) Fontainebleau 1819.



helleborine a fleurs rougee

Epipactis rubra

Epipactis rouge

Serapias Rubra des lieux couverts de la forêt de fontainebleau, à franchard.



Ophrys nid d'oiseau

Epipactis nidus avis

Epipactis nid-d'oiseau

Ophrys Nidus avis, nid d'oiseau, de la foret de fontainebleau, près franchard. mai. avec Ma Mère 1829



Ophrys à feuilles ovales.

Epipactis ovata
Epipactis ovale
Ophrys ovata des lieux ombragés du parc de fontainebleau 1829.



Tithimale
Reveil matin

Eupshorbe réveil matin

Euphorbia helioscopia du Jardin de Lignereux à Compiègne 8.bre 1830.



Esule capillaire

Euphorbia cyparissias Euphorbe cyprès

Esula Cyparissias. des lieux arides des environs de fontainebleau.

Cette plante fait vomir à la dose de 12 à 18 grains. son suc, comme celui de toutes les Euphorbes, est employé comme caustique, mais non sans dangers.

Garou.



Daphnea laureola

Daphné Lauréole L. recueilli au pied des pyrenées près oloron Janv. 1835.

Renouée amphibie



Polygonum Amphibium. Lin. Sur les eaux stagnantes du Canal de Provins. Juin 1830.



Phytolacca. (Lin.) Raisin d'Amérique.

Recueillie et peinte dans le mois d'août 1847 chez Mr Fesneau. Souvenir plein de charmes des aimables hôtes de la Garenne.



Amaranthus caudatus trouvée auprès du bois de Boulogne 1826.
Amaranthe à fleurs en queue



Paronichia verticillata. Lam. Des lieux cultivés des environs de Quimperlé. Recueilli et peint à la Garenne le 24 aout 1847. des sables humides ou l'eau a séjourné l'hiver

Paronique verticillée.



Gazon d'Olympe.

Statice Armeria. Lin. Recueilli près des bords de la mer aux environs de Morlaix. 12 avril 1844.



Statice Limonium L. cueilli par Mme Pelletier sur les bords de la mer aux environs de Morlaix. aout 1845

Statice limonium



Statice Dodarsii. Recueilli par M. Crouan aux environs de Brest et peint en août 1848.



Statice occidentalis Lin. Recueilli par M. Crouan de Brest et peint en Juillet 1848. Les différents organes de la fleur sont grossis à la loupe.



Anagallis Arvensis. Linn.
Anagallis Cœrulea. Lamb. Mouron bleu

Trouvé par M. Louis de Guernisac aux environs de Morlaix. juin 1839. rare.

Mouron rouge.



Anagallis arvensis Linnée. *Anagallis phœnicea* (Lambert) Compiègne 7bre 1830.



Anagallis Tenella des lieux humides des environs de Morlaix. aout 1840.
Mouron délicat



Chassebosse.
corneille.

Lysimaque commune

Lysimachia vulgaris (Lin.) dans des osiers au bord de la Loire. recueilli par Mme. Pelletier. juill. 18..



Lysimaque des bois

Leroux*ia* Nemorum.

Lisimaque. Lysimachia Sophia. Lysimachia nemorum

A la mémoire de feue Madame Aubert, ma sœur.

Mauléon entre le moulin de Montréal et le cimetière. avril 1834.

Coucou.



Primula officinalis fontainebleau 1829.

Primevère officinale

Primevère à grande fleurs.



Primula grandiflora (Lam.) veris acaulis Linnée.

Primevère uniflore. parc de fontainebleau 1829.



Polygala Vulgaris Var. cæspitosa. Recueilli par M. Ange de Guernisac, Morlaix 29 Mai 1841.
Polygala commun.



Veronica montana. L. Recueillie par Mr. Eugène de Créchquerault dans une herborisation forêt du Squirion à gauche de la route le 24 mai 1846.

Véronique de montagne.

Veronique ~~Chaînette~~.
Chênette.



Véronique petit chêne
Veronica chamaedris le long du tertre de la promenade à Provins. avril 1830.

Véronique Teucride



Véronique baguette

Veronica Teucrium trouvée par Mme Pelletier sur la hauteur de Labretonnière. mai 1830. Provins



Veronica scutellata dans les fossés humides des environs de Morlaix. donné par M. Eug. de Crécherault. Juill. 18 (1845)

Véronique à Écusson



Veronica Anagallis L. des bords de la mer. Tréflès

Véronique Mouron.

recueillie par M. L. de Guernisac le 7 juin 1845



Veronica Beccabunga. L. Recueillie par Mlle Marie Pelletier, aux environs de Morlaix, 29 mai 1845

Véronique Beccabunga

Véronique agreste.



Veronica hederæfolia. Véronique des Champs.
Véronique à feuilles de lierre

V. printanière



Veronica verna. Véronique printanière.

Thé d'Europe.



Veronica officinalis. Véronique mâle, Thé d'Europe. des Coteaux arides. Véronique officinale

Cette plante est employée comme cordiale, excitante et stomachique; on la prend en infusion Théiforme.



Veronica arvensis L. Recueillie par Mlle Marie Pelletier, dans les champs, aux environs de Morlaix. 19 avril 1845

Véronique des champs.



Veronica agrestis L. Recueillie par Mlle Marie Pelletier; dans les champs aux environs de Morlaix 16 avril 1845.
Véronique rustique.



Véronique à épi.

Veronica spicata. Lin.

Bois de Boulogne 15. 7bre 1829.

98



Veronique à feuilles de serpolet.

Veronica serpyllifolia. Lin. Recueillie par Mlle. Marie Pelletier aux environs de Morlaix le 11 avril 1844.



Euphraise officinale

Euphrasia officinalis (Linnée.) du grand parc de compiègne. Septembre 1830.



Euphrasia odontites. ♃. des environs de Morlaix. 25 Juillet 1848.

Euphraise dentée.



Bartsie visqueuse

Bartsia viscosa Lin. des environs de Morlaix, septembre 1841.



Rhinanthe glabre

Rhinanthus crista-galli dans toutes les prairies. orthez juin 1835.
glabra



Pedicularis Palustris. Lin.

Des prairies marécageuses des environs de Morlaix. Juin 1848.

Pédiculaire des marais.



Pédiculaire des bois

Pédicularis sylvatica (Lin) sur le chemin d'orthy à Bonut. juin 1835.



Orobanche bleuâtre

Orobanche cærulea — Morlaix Mai 1839.

recueillie par Mad. Pelletier à la terre de Lannidi près Morlaix.

Verveine officinale



Verveine officinale

Verbena officinalis. (Lin.) des environs de Libourne. Juillet 1832.



Lycopus Europaeus. Lin. Recueilli sur les bords de l'Isle près Quimperlé par M. L. Dorl Cuny dans une agréable promenade de Mr. Mad. Fesneau, Mr. L. Dor Cuny, Mr. Mad. Pelletier et Mlle. leur fille, le 18 aout 1847. Cette plante a été peinte à la Garenne



Sauge des prés.

Salvia Pratensis. la sauge des prés. juin juillet, dans les lieux secs, forêt de fontainebleau, 1826



Bugle rampante

Ajuga Reptans. Lin. des environs de Morlaix. 20 Mai 1844. recueillie par Mlle Marie Pelletier





Glecoma hederacea L. En mémoire de M.me la Supérieure et de Mess.mes les sœurs hospitalières de l'ordre de St Thomas de Villeneuve, à l'hospice de Morlaix. 8 Mai 1848.

Lierre terrestre

Ortie blanche



Lamier blanc

Lamium Album. le long des chemins, des haies et des fossés. Environ avril 1830.



ortié rouge.

Lamier tâché

Lamium maculatum, Wild.

Recueilli à Biaritz près Bayonne par Mad. Pelletier mai 1839.



Lamium purpureum Linn. des lieux cultivés de Morlaix. Décembre 1847.



Lamium incisum Linn. des lieux cultivés, Morlaix 1847

Lamier à feuilles incisées.



Lamier embrassant amplexicaule

Lamium Amplexicaule L. des lieux cultivés des environs de Provins ; mai 1830.



Galeopsis ochroleuca Lam. Recueilli et peint à la Garenne, propriété de M. Fesneau, le 27 août 1847.

Galéopsis à fleurs jaunes.



Galeopsis ochroleuca. Variété rose, Lam. recueilli par M. Fesneau, dans sa propriété de la Garenne près Quimperlé le 25 août 1847



Galeopsis Tetrahit. L^e. Lin. des environs de Morlaix: 7. Nov. 1844.

120

67



Variété du Versicolor

Galéopsis jaune

Galeopsis Ochroleuca Lamb. G. Grandiflora. Roth. Chill.

Recueilli par Mr L. de Guernisac à la Terre du Mur près Morlaix 26 8bre 1844.



Galeopsis bigaré

Galeopsis Versicolor. Lin

Recueilli aux environs de Morlaix le 4 novembre 1837 par Mr. Louis de Guernisac.



Betonica officinalis. ♃. Recueilli par Mad.me de Gurnisac. aout 1845.

Betoine officinale

193.

88

Ortie puante



Epiaire des bois

Stachys sylvatica (Linnee) dans les bois couverts, les taillis, les buissons.

Parc de St. Cloud. Septembre 1829.

124

68

Epiaire annuelle



Stachys annua L. dans les moissons et lieux cultivés. aux environs d'Issy. Septembre 1829.



Ortie jaune.

Galeopsis Galeobdolon. Lin.

Galeobdolon Luteum. Huds.

Galeobdolon jaune

des environs de Morlaix, août 1843.

126.

9

Thym Serpolet.



Thymus serpyllum (Lin.) des environs de Libourne, mai 1833.

Mélisse batarde.



Mélitte à feuilles de mélisse

Mellitis melissophyllum. melisse des bois. fontainebleau. trouvé par Mme. [illegible] aout 182[illegible]





Toque tertianaire

Scutellaria Galericulata Lin. Toque.

Recueillie par M. Louis de Guernisac aux environs de Morlaix en juin 1839.





Scutellaria Minor (Lin) cueillie par Mad. Fesneau dans une herborisation faite dans la foret de Carnoët avec la famille Pelletier le 19 aout 1847



Pinguicula Vulgaris, Lin. des lieux humides des environs de Morlaix.

Lusitanica

Grassette de Portugal.



Erine des alpes

Erinus Alpinus surtou les rochers des pyrénées sur la route d'oloron en espagne. juin 1835

Linaire
Cymbalaire



Linaria cimbalaria (Desfontaines) *Antirrhinum cymbalaria* (Linnée)

cette plante se trouve tout l'été sur les vieux murs un peu humide. celle ci a été dessinée à Sèvres en octobre 1829. avec de mauvaises couleurs

Velvote.



Linaire batarde

Linaria Spuria (Desf.) Antirrhinum Spurium (Lin.)

Des endroits cultivés des environs de Libourne 8bre. 1832.



Linaria striata. L. Recueillie par M. Mercier Lt. d'Artillerie Juillet 1845

Repens (Desfontaine)

Linaire Striée

137.

92



Linaria Supina Lin. Cueillie par le capne Kervern sur le quai de Tréguier à Morlaix. Juillet 1844.

Linaire couchée.



Linaire.

Linaire commune

Linaria vulgaris dans tous les lieux pierreux et incultes. été 1829.

Linaire. Lin sauvage.

Voir Antirrhinum majus pour les qualités médicinales.

139



Linaria maritima vel arenaria — Recueillie par M. Eug. de Crechquérault à Lanevez (Trestel) aout 1845.

Linaire maritime ou des sables



Mufle de veau.

Muflier à grande fleur

Antirrhinum Majus Sur les vieux murs. septembre 1829. Sèvres.

Les Antirrhinum sont des plantes actives et vireuses : on les emploient à l'extérieur, après les avoir contuse ; en application sur les ulcères sordides, on les a quelquefois administrées à l'intérieur dans l'hydropisie

141

99



Muffier rubicond

Antirrhinum Orontium. Lin.

dans les champs cultivés aux environs de Morlaix, septembre 1839.



Digitale pourprée

Digitalis Purpurea, Linn.

Recueillie par Mad. Pelletier à S.t Jean-pied-de-port au pied des Pyrenées. 1835.



Monstruosité de la Digitale pourprée,

Trouvée par Mr. Ange de Guernisac dans la commune de Plouigneau le 18 Juillet 1848.



Jusquiame noire

Hyosciamus Niger Lin.

des environs de Morlaix. Juillet 1841.

Pomme épineuse



Datura stramonium.

des environs de Tours, Juillet 1831.

Datura stramoine



Atropa Belladona (Linnée) de la foret de Compiègne, route de la marre aux Cannes 9bre 1830.



Morelle douce amère

Solanum Dulcamara. Dans les haies des environs de Morlaix. 1841.

héliotrope.
herbe aux verues.



Héliotrope d'Europe

Heliotropium europæum (Lin.) des environs de Libourne. Juillet 1833.



Echium vulgare. Lin. Recueilli par M.r Beau Adjoin[t] Maire de [illegible] laire Juill. 184

Vipérine commune



Gremil couché. Lithospermum — prostratum.

le 15 novembre 1835, nous trouvâmes cette jolie plante près du Phare de Biaritz à une lieue de Bayonne.

Pulmonaire



Pulmonaire officinale

Pulmonaria officinale de la foret de fontainebleau, 1829.

154.

109



Symphytum officinale. L. Recueilli par Madame la Supérieure de l'hospice civil de Morlaix le 4 juin 1846.
Consoude officinale.



152.

Symphytum Tuberosum. L. Recueilli par M. L. de Guernisac le 20 mai 1846.
à la grève de St. Michel, près de l'auberge à droite.
Consoude Tubereuse.



Scorpionne des champs.

Myosote annuelle

Myosotis annua

oreille de souris.

le long des chemins, dans les terres maigres. Moret 1829. avril.



Myosotis.

Vergiss mein nicht.

Нѣ забудущѣ.

Ne m'oubliez pas.

forget me not.

No me olvidas.

non dimenticarmi

Myosotis perennis
——— palustris (Lamark.)

Près d'un fossé sur la route du terrain de manœuvre à Tours. Trouvé par Jules Faizan. juin 1831.



Anchusa Italica. (Retz). Recueilli par M. Eug. de Crechquerault, environs de Penmarch. peinte en juin 1846.

Buglosse d'Italie.



Buglosse toujours verte

Anchusa Sempervirens. (Lin.) Buglose toujours verte

des environs de Morlaix. mai 1839.

Petite Buglose.



~~Ly fétide des champs~~

Lycopsis arvensis (Lin) le long de la loire à Tours juin 1831.



Cynoglossum officinale Linn. Recueilli par M. Eugène de Créchquérault aux environs de Penmarch le 14 juin 1846.

Cynoglossum. Cynoglosse officinale.



Grand Liseron. = Liseron des haies

Convolvulus sepium. (Lin.) dans les haies des environs de Tours juillet 1851.

Petit Lizeron



Liseron des champs

P. Lizeron. Convolvulus arvensis. des champs.



Cuscute à petites fleurs
Cuscuta Europæa Lamy

Cuscuta - Epithymum, vivant au dépend d'un *Teucrium - scorodonia*. Recueilli par Mad. Pelletier dans les environs de Morlaix le 7. septemb. 1837.



Menyanthes Trifoliata. Lin. de la prairie du Guernénic app.t à M.r de Guernisac. avril 1841.

Menyanthe trèfle d'eau



170

Chlora perfoliata. Lin. Récoltée par Melle Louise Guérin, dans les ruines de Lavardin le 29 juin 1851.

Chlore enfilée.

Gentiana lutea

Gentiana pneumonanthe



Gentiana acaulis — Rapportée des pyrénées par Mr Gustave de Lauzanne en 1849. cultivée dans son jardin. mai 1850.

Gentiane



Gentiana utricolosa
Gentiane à calice enflé.
Recueillie sur les monts Pyrenées par Mad. Pelletier le 7 avril 1835.



Gentiane des champs

Gentiana Campestris. L. Trouvée par le Docteur Lebir aux environs de Morlaix. Octob. 1843. peint en 1844.



Chironie centaurée
Chironia centorium fontainebl[eau]
1828.



Chironia Ramosissima, Ch. recueilli par M. Eug. de Crechquerault à Lanerès (Cresles) août 1845.

Chironia rameuse.



Chironia Guernisaci. Recueillie par M.e L.e de Guernisac sur les pelouses sèches des environs de Morlaix. Juillet 18[illegible]
1825

Chironie de Guernisac. Erythrea diffusa — Erythrea diffusa.



Vinca Minor de la forêt de fontainebleau. avril 1829.
Pervenche couchée



Vinca Major (Linnée) dans une haie de clôture à la ville haute. Provins avril 1830.
Pervenche à grandes fleurs



Trois bruyères de la foret de Fontainebleau 1828.

La premiere bruyère. Erica vulgaris. Calluna erica Callune bruyère

2.e Erica cinerea Bruyère cendrée

3.e Erica, variété de la cinerea



Erica Tetralix. Lin. Recueillie par Mr Lozach fils médecin. le 27 juillet 1845 aux environs de Morlaix.
Bruyère à quatre faces



Erica Arborea L. cultivée dans les jardins de Morlaix. 19 mai 1845
Bruyére en arbre.



Une Bruyère des Pyrénées

Erica ciliaris

Bruyère ciliée

. de la montagne Mataléon près Mauléon juillet 1834.



Erica herbacea. L. recueillie dans le jardin de Pors-an-trez: importée des Pyrenées. 10 mars 1845.

Bruyère à fleurs herbacées.



Erica Mediterranea. L. des jardins de Morlaix, importée du midi de la france. 22 mars 18
1845

Bruyère de la Méditerranée



Erica Polytrichifolia L. cultivée dans le jardin de Pors-an-trez. 30 mars 1845.

Bruyère à feuilles de Polytrich



Arbutus Uva ursi. L. Du jardin de Pors-an-trez, apporté des Pyrénées par M. Gustave de Lauzanne   peint le 19 mai 1845.

Arbousier Busserole. Raisin d'ours.



Airelle, Myrtille.

Vaccinium Myrtillus. Lin. dans les bois des environs de Morlaix. juillet 1844.

190.